


相关基础知识回顾与补充



泛函分析基础知识

■ 线性空间

■ 赋范空间

■ 内积空间

■ 正交原理

一、线性空间

定义【域（实数域|复数域）】对数的集合 K ，如果满足以下条件：

1 . 包含零元素、单位元素，即 $0 \in K, 1 \in K;$

2 . 对四则运算封闭，即 $(\forall a, b \in K)$

$$a + b \in K, \quad a - b \in K, \quad ab \in K, \quad \frac{a}{b} \in K \quad (b \neq 0)$$

则称 K 为数域。

线性空间

定义【线性空间】设 V 是非空集合, $\alpha, \beta, \gamma \in V$, K 是一个数域, $\lambda, \mu, \nu \in K$, 建立加法 \oplus 和数乘 \circ 两种运算。若对于两种运算封闭

$$\alpha \oplus \beta \in V, \quad \lambda \circ \alpha \in V;$$

关于定义的两种运算满足以下 8 条运算规律:

(1) 加法交换律 $\alpha \oplus \beta = \beta \oplus \alpha$

(2) 加法结合律 $\alpha \oplus (\beta \oplus \gamma) = (\alpha \oplus \beta) \oplus \gamma$

(3) 存在零元素 $\theta \in V, \quad \alpha \oplus \theta = \alpha$

(4) 存在负元素 $\alpha \oplus \beta = \theta \Rightarrow \beta = -\alpha, \quad -\alpha \in V$

(5) 分配律 $(\lambda + \mu) \circ \alpha = \lambda \circ \alpha \oplus \mu \circ \alpha$

(6) 分配律 $\lambda \circ (\alpha \oplus \beta) = \lambda \circ \alpha \oplus \lambda \circ \beta$

(7) 结合律 $\lambda \circ (\mu \circ \alpha) = (\lambda \mu) \circ \alpha$

(8) 单位 1 $1 \circ \alpha = \alpha, \quad 1 \in K$

则称 V 为线性空间 (向量空间), $\alpha, \beta, \gamma \in V$ 称为向量。

说明：

- ❖ 线性空间中的元素不一定是通常意义下的向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ ，但是统称为向量；
- ❖ 线性空间定义的加法和数与向量的乘法不一定是通常意义下的加法与向量的乘法。

【例 1】 n 元有序数组构成的向量 $(a_1, a_2, \dots, a_n)^T$ 的集合，关于通常意义下的加法

与向量的乘法，封闭；满足 (1) - (8) 条性质。这个集合构成向量空间，记为 R^n 。

【例 2】 考虑 $V = \{\alpha = (a_1, a_2) \mid a_1, a_2 \in R\}$ 和实数域 R ，定义两种运算：

$$(1) \quad \forall \alpha = (a_1, a_2), \beta = (b_1, b_2) \in V, \alpha \oplus \beta = (a_1 + b_1, a_2 + b_2);$$

$$(2) \quad \forall k \in R, k \circ \alpha = (ka_1, 0).$$

显然，第 8 条要求不满足 $1 \circ \alpha = (a_1, 0) \neq \alpha$ 。所以， V 不构成线性空间。

【例 3】考慮线性齐次微分方程的所有解

$$V = \{y = f(x) \mid y''(x) + py'(x) + qy(x) = 0\}$$

在 V 中定义通常函数的加法与数乘。显然 齐次微分方程的解 $y_1 + y_2$, ky_1 仍然是线性齐次微分方程的解, (1) - (8) 条性质满足, 所以形成线性空间。

【例 4】考慮次数小于等于 n 的实系数多项式集合

$$V = \{p(x) \mid p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_nx^n, a_i \in R, i = 1, 2, \dots, n\}$$

在 V 中定义通常多项式的加法与数乘。显然, V 构成线性空间, 记为 $R_{n+1}[x]$ 。

二、内积空间

定义【内积与内积空间】 设 H 是数域 K 上的线性空间, 定义函数 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow K$, 使

得: 对 $\forall x, y, z \in H, \alpha \in K$, 满足

1) $\langle x, x \rangle \geq 0$, 且 $\langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0$;

2) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$;

3) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle, \langle \alpha x, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle$.

则称 $\langle x, y \rangle$ 为数域 K 中 x 与 y 的内积, 而称定义了内积的空间 H 为内积空间。

定义【内积诱导距离与范数】

- (1) 范数 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 称为由内积诱导的范数。
- (2) 距离函数 $\rho(x, y) = \|x - y\| = \sqrt{\langle x - y, x - y \rangle}$ 称为由内积诱导的距离。

说明:

- (1) 内积与由内积诱导范数的满足三角不等式关系——**许瓦兹不等式** $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$.
- (2) 由内积诱导的范数满足范数公理 \Rightarrow 内积空间按照由内积导出的范数, 是线性赋范空间。
但反之不然。

希尔伯特空间(Hilbert Space)

定义 设 H 是内积空间, 若 H 按照由内积诱导的范数成为 Banach 空间, 则称 H 是希尔伯特空间。

【例 2】 l^2 空间按照内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{k=1}^{\infty} x_k \bar{y}_k$ 是内积空间; l^2 空间按照由此内积导出的范数

$\|\mathbf{x}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} x_k^2}$, 是 Banach 空间, 因而是 Hilbert 空间; l^2 空间中由此内积导出的距离

为 $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = \sqrt{\sum_{k=1}^{\infty} (x_k - y_k)^2}$ 。

【例 3】 $L^2[a, b]$ 空间按照内积 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \int_a^b \mathbf{x}(t) \bar{\mathbf{y}}(t) dt$ 是内积空间; $L^2[a, b]$ 空间按此内积

导出的范数为 $\|\mathbf{x}\| = [\int_a^b |\mathbf{x}(t)|^2 dt]^{\frac{1}{2}}$, 是 Banach 空间, 因而是 Hilbert 空间。 $L^2[a, b]$ 中由内积导出的距离为 $\rho(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\| = [\int_a^b |\mathbf{x}(t) - \mathbf{y}(t)|^2 dt]^{\frac{1}{2}}$ 。

【例 4】 $C[a,b]$ 按照范数 $\|x\|_\infty = \max_{t \in [a,b]} |x(t)|$, 是线性赋范空间, 但 $C[a,b]$ 不是内积空间。

【证明】 取 $x = 1, y = (t-a)/(b-a) \in C[a,b]$, 因此 $\|x\| = 1, \|y\| = 1$, 同时


$$\|x + y\| = \max |1 + (t-a)/(b-a)| = 2$$

$$\|x - y\| = \max |1 - (t-a)/(b-a)| = 1$$

注意到 $\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 5 \neq 4 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$, 说明 $C[a,b]$ 中范数不满足平行四边形公式, 因而不是由内积导出的范数。所以 $C[a,b]$ 不是内积空间。

三、正交分解与投影定理

- ◆ 在解析几何中，两个向量正交的充分必要条件是它们的内积等于0。
- ◆ 向量 x 在空间中坐标平面上的正交投影向量 x_0 是将向量的起点移到坐标原点，过向量的终点做平面的垂线所得的垂足与原点之间的有向线段而得到的。
- ◆ $x=x_0+x_1$ ，其中 $x_1\perp$ 该坐标平面。
- ◆ $x=x_0+x_1$ 称为 x 关于坐标平面的正交分解。



- 可以将正交分解和正交投影的概念与推广到一般的内积空间中。
- 由此获得的投影定理是一个理论和应用上都极其重要的定理，利用投影定理可以将内积空间分解成两个子空间的正交和。
- 这是内积空间特有的性质，投影定理在一般的巴拿赫空间中并不成立（因为巴拿赫空间中没有正交性的概念）。
- 在实际应用中，投影定理还常被用来判定最佳逼近的存在性和唯一性。

定义 【正交】 设 H 是内积空间, $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in H$, $M, N \subset H$, 那么

$$(1) \mathbf{x} \perp \mathbf{y} \Leftrightarrow \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0;$$

$$(2) \mathbf{x} \perp M \Leftrightarrow \forall \mathbf{y} \in M, \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0;$$

$$(3) M \perp N \Leftrightarrow \forall \mathbf{x} \in M, \forall \mathbf{y} \in N, \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 0.$$

定理 【勾股定理】 设 H 是内积空间, 若 $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in H$, 且 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, 则 |

$$\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$$

说明:

- 1) 一般的内积空间中, 若 $\mathbf{x} \perp \mathbf{y}$, 则有勾股定理 $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$ 成立, 但反之不然。
- 2) 在实内积空间中, $\mathbf{x} \perp \mathbf{y} \in H \Leftrightarrow \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2 = \|\mathbf{x}\|^2 + \|\mathbf{y}\|^2$ 。

定义【正交补】设 H 是内积空间, $M \subset H$, 称集合 $M^\perp = \{x \mid x \perp y, \forall y \in M\}$ 为 M 在 H 中的正交补。

定理【正交补的性质】设 H 是内积空间, 则

$$(1) \quad H^\perp = \{0\}, \quad \{0\}^\perp = H;$$

$$(2) \quad M \subset H, M \cap M^\perp = \{0\};$$

(3) $\forall M \subset H, M^\perp$ 是 H 的闭线性子空间, 即 H 的完备子空间。

第(1)和(2)根据定义可以得出。考虑第(3)条结论，实现上， $\forall \mathbf{x}, \mathbf{y} \in M^\perp, \forall \mathbf{z} \in M$ ，

有 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle = 0, \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = 0$ ，因此

$$\langle \alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = \alpha \langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle + \beta \langle \mathbf{y}, \mathbf{z} \rangle = 0, \forall \alpha, \beta \in K$$

说明 $\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y} \in M^\perp$ ，即 M^\perp 是 H 的线性子空间。又设 $\forall \{\mathbf{x}_n\} \in M^\perp, \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{x}_n = \mathbf{x}, \forall \mathbf{z} \in M$ ，

可知 $\langle \mathbf{x}, \mathbf{z} \rangle = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \mathbf{x}_n, \mathbf{z} \rangle = 0$ ，所以 $\mathbf{x} \in M^\perp$ 。因此 M^\perp 是 H 的闭线性子空间。

定义【正交分解与正交投影】 设 H 是内积空间, $\forall M \subset H$ 是线性子空间, $\mathbf{x} \in H$, 如果存在 $\mathbf{x}_0 \in M$, $\mathbf{x}_1 \in M^\perp$, 使得

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_1$$

则称 \mathbf{x}_0 为 \mathbf{x} 在 M 上的正交投影, 而称上式为 \mathbf{x} 关于 M 的正交分解。

定理【投影定理】 设 M 是希尔伯特空间 H 的闭线性子空间, 则对 $\forall \mathbf{x} \in H$, 在 M 中存在唯一的正交投影 \mathbf{x}_0 , 使得

$$\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \mathbf{x}_1$$

其中, $\mathbf{x}_1 \in M^\perp$ 。